



Хэрэглэх заавар: Хэрэглэгчдэд зориулсан мэдээлэл

GRIFOLEX 500

Уүж хэрэглэх уусмал бэлтгэхэд зориулсан нунтаг

Парацетамол / Аскорбины хүчил / Фенирамин малеат

Уг эмийн бэлдмэлийг хэрэглэхийн өмнө энхүү зааварт багтсан мэдээллийг сайтар уншиж танилцана уу.

Ихэвчлэн эм хэрэглэхийн өмнө энд тусгагдан зааврыг эмч, эм зүйч танд мэдээлсэн байх ёстой.

- Зааврыг дахин унших шаардлага гарах тул хадгална уу.
- Эөр илүү мэдээлэл авахыг хувьслэв эм зүйчээс лавланда уу.
- Хэрэв танд зааварт тусгагдаагүй гаж нөлөө илэрэл эмч, эм зүйчид мэдэгдэнэ уу.
- 14-р хэсэгт багтсан!
- Хэрэв таны бие эм хэрэглэсний 3 хоногт сайжрахгүй бол эмчид заавал мэдэгдэнэ.

Зааварт:

1. Грипофлекс 500 гэж юу вэ, юунд хэрэглэх вэ.
2. Грипофлекс 500 хэрэглэхийн өмнө танд юу шаарддагдах вэ.
3. Грипофлекс 500 хэрхэн хэрэглэх вэ.
4. Илэрч болох гаж нөлөө
5. Грипофлекс 500 хэрхэн хадгалах вэ.
6. Бусад мэдээлэл багтсан.



1. Грипофлекс 500 гэж юу вэ, юунд хэрэглэх вэ

Грипофлекс 500 нь өвдөлт наамдаа (өвдөлт хөнгөвчлөх), халуун бууруулах үйлдэлтэй нийтмэн бэлдмэл юм. Найрлагандаа идэвхтэй 3 нэгдэл агуулна: парацетамол, аскорбины хүчил (витамин С), Фенирамин малеат / цаашид фенирамин гэх.

Грипофлекс 500 эмийн амьсгалын дээд замын үрэвэл, ханиад томууны үеийн толгой

өвдөх, бие шархирах, халтуурах, хамар, синус битүүрэх, ринит (нус гоожих), найтаах зэрэг

шинж тэмдгийг арилгах зорилгоор хэрэглэнэ.

2. Грипофлекс 500 хэрэглэхийн өмнө танд юу шаарддагдах вэ

Дараах тохиолдолд Грипофлекс 500 хэрэглэхүүгийн

- Хэрэв та бэлдмэлийн найрлага дах идэвхтэй болон бусад нэгдэлд харшилтай бол (6-р хэсэгт буй);
- Хэрэв та цусны даралт ёндер бол (arterийн гипертензи);
- Хэрэв та нүдний хаалттай өнцөгт даралт ихдэлтэй бол;
- Хэрэв таны элэг, бөөр, зүрх судас, бамбай буличирхай, уушги хүнд хэлбэрээр өвчилсөн бол (мэн гурсан хоолайн багтраа);
- Хэрэв та ходоо дээрх гэдэсний шархлаатай бол;
- Хэрэв та нийр буличирхай, давсагны эмгэгтэй бол;
- Хэрэв та хундрэлтэй шээдэг бол (туруу буличирхайн томрол);
- Хэрэв та цусны эсүүдээний эмгэгтэй бол;
- Хэрэв та ховор тохиолдоо удмын эмгэг болох глюкоз-6 фосфат дегидрогиназа дутагдалтай бол (цусны улаан эсийн эмгэг);
- Хэрэв та жирэмсэн, хөхүү бол эмийн хэрэглэхийг хориглоно.

Энэ эмийг ёндер настан болон 15-с доош насны хүүхдэд хэрэглэхгүй.

Цусны булэгнэлт алдагдсан өвчтөнд эмийг хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй.

Грипофлекс 500 эмийг найрлага дах парацетамол, фенирамин, стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүд, төв мэдрэлийн системд нэлөөлөх (гипнотик, гурван цагирагт сэтгэл үнаптын эсрэг бэлдмэл, танквилизаторууд), даралт бууруулах бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэхийг хориглоно.

Анхааруулга, сэргэмжлүүлэг

Грипофлекс 500 хэрэглэх үед дотор муухайрах, бөөлжих, хэвлэгээр өвдөх, хоолны дуршил буурах, тайван бус болох, толгой эргэх, чих шуугих, сонсгол муудах, бухимдал төрвэл эмийн хэрэглээг зөсгөн яаралтай эмчид мэдэгдэнэ.

Дараах тохиолдолд Грипофлекс 500 хэрэглэхийн өмнө эмчид мэдэгдэн болгоомжлох ёстой:

- Хэрэв та элэг бөөрний эмгэгийн улмаас шаналж буй бол (хүнд хэлбэрт хэрэглэхийг хориглоно);
- Хэрэв та цусы эсүүдээний эмгэгтэй бол;
- Хэрэв та 65-с дээш настай бол;
- Хэрэв та согтууруулах ундаа хэрэглэдэг бол заавал мэдэгдэнэ.

Хэрэв 3-с дээш ногон таны халуурах, өвдөх шинж тэмдэг байсаар байх болон хоолой улайсан бол эмчид хандана уу.

Парацетамол удаан хугацаанд ёндер тунгаар хэрэглэснээр элэг, бөөр хордуулж болно. Тунг хэтрүүлэн хэрэглэж болохгүй!

Грипофлекс 500 эмийн харилцан нөлөө

Та өөр зорилгоор эмийн бэлдмэл хэрэглэж буй бол эмч, эм зүйчид мэдэгдэнэ уу.

Грипофлекс 500 эмийг найрлага дах парацетамол, фенилэфрин, стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүд, төв мэдрэлийн системд нэлөөлөх (гипнотик, гурван цагирагт сэтгэл үнаптын эсрэг бэлдмэл, танквилизаторууд), даралт бууруулах бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэж болохгүй.



Дараах эмүүдээс аль нэгийг хэрэглэж буй бол эмч, эм зүйчид мэдэгдэнэ уу:

- Барбитаатуд, фенитонин, карбамазепин, рифампицин, эпизний микросомын фермент идэвххүүгэгчид (парацетамолын элэг хордуулах эрдэлэйг нэмэгдүүлнэ);
- зидовудин (парацетамолтой хавсарсан хэрэглээ аль алины хоруу чанар ихсэн, грануулын тоо, цусны цагаан эсийн тодорхой төрөл буурах шинж олон удаа ажиглагдсан гэж тэмдэглэгдсан);
- пенициллин (аскорбины хүчил пенициллини шимэгдэлтийг ихэсгэнэ);
- гепарин, шууд бус антикоагулянтиуд (аскорбины хүчил гепарин, шууд бус антикоагулянтиудын тийдээд нэлөөлөн);
- салицилатууд (хамт хэрэглэхэд аскорбины хүчил шээсэнд талст үүсэх эрдэлэйг нэмэгдүүлнэ).

Грипофлекс 500, согтууруулах ундаа

Согтууруулах ундааны нэлөөллийг нэмэгдүүлэх тул аль болох хамт хэрэглэхээс зайлсхийнэ. Мөн согтууруулах ундаа нь парациетамолын гаж нөлөөг нэмэгдүүлэх, цочмог нийр буличирхайн үрэвсэл үүсгэнэ.

Жирэмсэн, хөхүүл үе

Энэ эмийг жирэмсэн, хөхүүл үед хэрэглэхийг хориглоно.

Жолоо барих, механизмтай ажиллах чадварт нөлөөлөх

Энэ эм нь нойр хүргэж, ядраадаг учир машин барьж байх үед хэрэглэхгүй байх нь зүйтэй.

Энэ эмийн найрлаганд аспартам, жаргах нарны шар өнгө FCF (E110) агуулагдана Энэ эм аспартам (фенилаланин эх үүсвэр) агуулах тул фенилкетонуритай хүмүүсийн хувьд хор хөнөөлтэй байж болох юм. Энэ эм жаргах нарны шар өнгө FCF (E110) агуулдаг тул харшил үүсгэж болзошгүй.

3. Грипофлекс 500 хэрэглэх арга

Эмийн хэрэглэх зааврыг анхааран эмч, эм зүйчийн зөвлөгөөний дагуу хэрэглэнэ. Итгэлгүй байвал эмч, эм зүйчээс павланя.

Эмчилгээг өвчний шинж тэмдэг илэрсэн даруйд аль болох хурдан эхэлнэ.

Нэг багцыг аяга халуун усанд найруулж булзэнээр ууна.



Насанд хүрэгчид, 15-с дээш насныхан

Өдөрт гурван удаа уух ба нэг өдөрт 4-с их удаа хэрэглэхгүй. Хоногийн дээд тун 3 багц. Тогтоогдсон тунг хэтрүүлэхийг хориглоно.

Бөөрний эмэгтэй өөчтөнд

Эмийн тунг 8-с багагүй цагийн зайдай ууна.

Ахмад настанд

Тунг тохиуулах шаардлагагүй.

Грипофлекс 500 тунг хэтрүүлэн хэрэглэсэн бол

Парацетамолын тун хэтрэвэл аюултай. Ноцтой үр дагавар бий болохос сэргийлж нэн даруй эмнэлгийн тусламж авах шаардлагатай.

Шинж тэмдэгээ: дотор муухайрах, бөөлжих, өрч, хэвлэгээр өвдөх, хоолны дуршил буурах, толгой эргэх, чих шуугих (чихэнд байна юм сонсогдох), сонсгол муудах (ялангуяа өндер настанд), тайван бус болох шинж илэрнэ.

Хэрэв та Грипофлекс 500 хэрэглэхээ мартсан бол

Мартсан тунг давхарлан ухыг хориглоно.

4. Илэрч болох гаж нөлөө

Бүх эмийн адил хүн бурд биш ч гаж нөлөө үүсгэж болох юм.

Элбээ (100 хүнд 1-с их)

- ам хатаг
- дотор муухайрах
- өрч очрим өвдөх
- суулгах

Ховор (1,000 хүнд 1-с их)

- ёндер настанд нойрмоглох, толгой өвдөх, сэргэлт буурах
- аккомодацийн алдагдах (харааны чадвар буурах)
- зүрхийн цохилт нэмэгдэх
- цусны даралт тур зуур нэмэгдэх (даралт ихсэх)
- туралт, загатнаа, чонон хөрөс, Кийнин хаван (нүүр, уруул, хэл, хоолой, биеийн аль нэг хэсэгт эзэнт хавагнах, амьсгалах болон залгихад хүндэртэй болох)
- шаардхад үүсэх

Маш ховор (10,000 хүнд 1-с их)

- цусын багадалт (улаан эсийн дутагдал)
- тромбоцитопени (цусны яллас эсийн тоо буурах)
- лейкопени (цагаан эсийн тоо цеөөрх)
- агранулоцитоз (цусны цагаан эсийн тодорхой төрөл, гранулоцитын тоо их хэмжээгээр буурах)
- метемглобулини (цусны метемглобулини гемоглобини хэлбэр, нехэн төлжилт хэвийн бус болох)

Гаж нөлөөний тайлан

Хэрэв танд гаж нөлөө илэрвэл эмч, эм зүйчид хэлнэ. Зааварт тусгагдаагүй гаж нөлөө илэрч болно. Иймд та үндэсний гаж нөлөөний тайллангийн системд мэдээлнэ. Ингэснээр энэ эмийн аюулгүй байдлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөд тусална.

5. Грипофлекс 500 хэрхэн хадгалах вэ

Гэрлийн тусгалаас хамгаалан, 25 °C ихгүй хэмд хадгала.

Хүүхдээс хол хадгала.

Савлаганаа дээр заагдсан хугацаа дууссан бэлдмэлгийг хэрэглэхийг хориглоно. Хугацаа дусах он, сарын эцсийн дээрэй тэмдэглэсэн байна.

Хэрэглээгүй эм